

(Litsia grandis)

ໄກຍ

ນາຍຈົກສູງແນບ

ທ້າວນາສວນພຸດຍສາດຕະເຂາອະນະ ຈ.ຕວັງ

ກຣມປາໄນ

ເສນອຕອຫປະຊຸມ

ກາຮ້າສັນນາທາງວະນວັນນວິທຍາຄວົງທີ ๒

ເຮື່ອງ ໄນໂຕເວົ້າ

ວັນທີ ๔ ~ ๑๑ ນັກງາມ ๒๕๖๒ ປີ ຄພະວັນສາສົກ ມາຮວິທຍາລັບເກຫຍາກາສົກ

(Litsia grandis)

ไม้ทั้งเป็นไม้ต้นเดิมอยู่ทางภาคใต้ แต่ตามพอลงไปถึงนราธิวาส ขึ้นไปปะปันอยู่ทั่วไปในบาระดับสูงไม่เกิน ๔๐๐ เมตร สูงกว่านานมีนา แต่ไม่มากนัก ขันอยู่กราดจักราจายไม้เป็นหมุน

การสืบพันธุ์ทางธรรมชาติไม่เคยอยู่ดี เพราะไม้ทั้งเป็นไม้ที่มีใบใหญ่ต้องการแสงมากอกได้ดี แต่หลังจากออกดอกแล้วมักจะตายภายในหัวเดียวเลย เมล็ดไม้ทั้งหมดสูงไม่พร้อมกัน จะอยู่แยกกันโดย นกจะมา กินแล้วหายเมล็ดทั้งหมดจะตกต่อไป

ลักษณะทั่วไปของต้นทั้งจะ ใบร่องร่อง ไม่ค่อยมีกิ่งก้านมาก เป็นลักษณะเดียวกัน ร่องหางกันมา และแตกเป็นสาขา มีหัวรากเป็นวงช้า ๆ เป็นหย่อม ๆ

ไม้ทั้งเป็นไม้ที่มีใบกว้างประมาณ ๑๐-๒๐ ซม. ยาว ๑๕-๒๐ ซม. ปลายใบมนป้าน หนาใบเรียบ หลังใบมีขนอ่อน ๆ หลังใบมีร่องเห็นเส้นแกนของใบและเส้นเอ็นไข่สัก

ดอก ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม ออกเป็นช่อ ๆ ติดตามกิ่งต่อกันไปถึงปลายกิ่ง เมื่อตอนบ่าย คนไม้อื่น ออกดอกเป็นจุ่งประมาณ ๑-๓ บรรจุก ของแต่ละต้นจะเป็นช่อ ๆ ชื่อ ๑๐-๑๕ ดอก ก้านของดอกยาวประมาณ ๑ ซม. ดอกทุก朵มีโภคภายน้ำประมาณ ๒ ซม. เนื้อบานกว้างประมาณ ๑ ซม.

ผล โภคภายน้ำ ๒ ซม. หรือกว้างเล็กน้อย มีเนื้อหุ้น กากอบกิน บางครั้งแก่ไม่พร้อมกัน ฉะนั้นยากแก้การเก็บมาก ต้องรอให้แกนกิ่งก้านแล้วหายทิ้งลงมา บางต้นลูกจะแก่พร้อมกัน จึงง่ายต่อการเก็บ และจะแก่เป็นจำนวนมาก ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม

การเพาะหลังจากเก็บมาแล้ว ตากไว้ในร่มประมาณ ๓-๔ วัน และหัวานลงในเยล彭 เพาะหมัดคนอนช้าง เป็นทราย ก้อนหัวานเมล็ดควรจะรากเยล彭เพาะด้วยยาฆ่าแมลง ก่อน เพราะถ้าไม่รากคนหัวจะเริ่มแตกใน ๖ ใบ พอกหนอนหรายจะกินรากตายหมัดหงับลงหนอนที่อยู่ในทรายหรือคินหัวไปช่วยกินรากกล้าไม่หั้งมากกว่าไม้อื่น ๆ หลังจากที่แตกใบอ่อน ๖ ใบแล้ว ควรดูดด้วยยาฆ่าแมลงอีกครั้ง กันหนอนที่อยู่ในคิน

หลังจากที่อยู่ในเยล彭 เพาะอย่างน้อย ๙ ปี ถอนไปปลูกโดยไม่กองไส้สูงบลู๊กໄค -การถอนไปปลูก-

การถอนไปปลูก การถอนไม้ทั้งไปปลูกหรือไม่กระยะเดย์อัน ๆ โดยทั่วไปควรจะถอนทิ้งไว้ ก่อน ๖ - ๘ วันแล้วคุณใบพื้นที่หมัก วางไว้คราวไม้เพื่อต้องการให้กล้าไม่มีความตื้นค้างในการรอคตายแล้วจะรีบออกหากแตกใบ เน่าที่ดินคล่องมากแล้วหยอดไว้ก่อน ๒-๓ วัน แล้วนำไปปลูกเป็น เช่นการรอคตายจะมีถึง ๔๕ - ๕๐% ถัดอนกล้าในขณะฝนตกแล้วนำไปปลูกโดย เป็น เช่นการรอคตายจะมีเพียง ๕๐ - ๖๕% เท่านั้น เพราะว่ากล้ากำลัง อ่อนน้ำเต็มที่ กล้าที่ปลูกจะเน่าตายหมักแตกหากกล้าที่มีอยู่ไม่เกิน ๖ เดือน เป็น เช่น การรอคตายมีเพียง ๓๐ - ๔๐% เท่านั้น

การปลูกควายกล้าที่ช้าอยู่ในถุง ถอนปลูกลงทำให้แข็งแกร่ง (Hardening) ก่อนทุกครั้ง การทำ Hardening ทั้งวัย ชากาไม้ในถุงให้เรื่องชำนาญกว่า ไม่ระนาดไม่ไนหลังจากที่ได้ชากาไม้ทุกกล้าไม้แข็งแกร่งสักแค่ ตามปกติทางภาคใต้จะปลูกในราวดีอนมีน้ำยันดึงสิงหาคม เดือนกันยายนถึงตุลาคม ปลูกซ้อม จะน้ำในราวดีอน พฤหัสบดี เริ่มทำให้แข็งแกร่งสักแค่ การปลูกควายถุงหรือเปลือยราชนอนอยู่กับบ่อบำบัด และภูมิประเทศ ถูกภูมิประเทศที่เป็นภูเขายากแกกรากล้าเลี้ยงถุงไปบนภูเข้า แต่มาเป็น ผืนหраницๆ แล้วจะปลูกควายกล้าอยู่ในถุง

อัตราความเจริญเติบโตของไม้ทั้ง ชั้งปลูกไว้ที่เข้าช่อง ปี ๒๕๔๔

ตรวจวัดเพื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

ลำดับที่	ความตื้น ซม.	ความสูง ม.	ความตื้นสำหรับ กลาง ซม.	หมายเหตุ
๑.	๗๗.๐๐	๒๖.๕๐	๖๓.๖๖	ความตื้นที่เป็นเส้นรอบวง
๒.	๗๙.๔๐	๒๔.๔๐	๖๐.๖๕	
๓.	๗.๐๐	๕.๙๐	๖.๖๐	
๔.	๗๙.๗๐	๒๓.๖๐	๖.๗๕	
๕.	๗๖.๗๐	๒๖.๕๐	๖๓.๔๕	
๖.	๖๔.๔๐	๒๔.๑๐	๖๔.๖๘	
๗.	๖๐.๓๐	๒๓.๔๕	๖๖.๐๐	
๘.	๗๖.๖๐	๒๓.๖๐	๖๐.๖๗	

ลำดับที่	ความโถ ชม.	ความสูง ม.	ความโถเส้นมาศูนย์ กลาง ชม.	หมายเหตุ
๙.	๔๖.๐๐	๑๘.๘๐	๓๗.๑๘	ความโถวัดเป็นเส้นรอบวง
๑๐.	๔๕.๘๐	๑๘.๑๕	๓๔.๘๕	
๑๑.	๔๗.๙๐	๒๙.๙๐	๒๗.๗๖	
๑๒.	๓๔.๖๐	๒๙.๓๐	๒๗.๔๕	
๑๓.	๖๗.๙๐	๒๐.๘๐	๒๙.๗๕	
๑๔.	๑๒.๐๐	๕.๙๐	๓.๙๖	
๑๕.	๓๔.๐๐	๑๘.๖๐	๑๖.๐๘	
๑๖.	๑๘.๗๐	๖.๓๐	๔.๙๖	
๑๗.	๑๘.๖๐	๗.๖๐	๖.๐๐	
๑๘.	๖๓.๗๐	๒๒.๔๕	๒๐.๗๗	
๑๙.	๕๗.๙๐	๑๕.๖๕	๑๔.๕๔	
๒๐.	๔๖.๖๐	๑๘.๙๐	๑๔.๐๖	
๒๑.	๕๗.๐๐	๑๕.๖๐	๑๖.๖๖	
๒๒.	๕๗.๐๐	๒๙.๖๐	๒๗.๕๖	
๒๓.	๗๕.๖๐	๒๙.๗๕	๒๗.๖๖	
๒๔.	๕๗.๖๐	๑๘.๗๕	๑๗.๘๖	
๒๕.	๔๗.๖๐	๑๘.๖๕	๑๗.๘๖	
๒๖.	๓๗.๕๐	๑๔.๐๐	๑๑.๙๗	
๒๗.	๔๕.๐๐	๑๖.๐๐	๑๔.๔๘	
๒๘.	๔๕.๖๐	๑๖.๗๕	๑๖.๖๖	
๒๙.	๔๕.๖๐	๑๖.๘๐	๑๖.๖๖	
๓๐.	๔๕.๖๐	๑๖.๘๐	๑๖.๖๖	
๓๑.	๑๐๖.๖๐	๒๕.๘๕	๒๗.๑๗	
๓๒.	๓๔.๖๐	๑๓.๖๐	๑๖.๗๖	

ลำดับที่	ความโถ่ ชม.	ความสูง ม.	ความโถ่เส้นผ่าศูนย์กลาง ชม.	หมายเหตุ
๓๐.	๖๖.๖๐	๙๕.๖๐	๙๔.๘๒	ความโถ่คือเป็นเส้นรอบวง
๓๑.	๗๕.๖๐	๙๔.๖๐	๙๙.๗๒	
๓๒.	๕๐.๐๐	๙๗.๔๐	๙๔.๘๐	
๓๓.	๗๙.๐๐	๙๐.๗๐	๙๙.๗๗	
๓๔.	๙๙.๙๐	๘.๙๐	๕.๙๕	
๓๕.	๕๐.๙๐	๙๖.๐๐	๙๖.๙๖	
๓๖.	๗๙.๖๐	๙๔.๘๐	๙๐.๗๙	
๔๐.	๖๙.๐๐	๙๕.๐๐	๙๕.๖๐	
๔๑.	๕๙.๖๐	๙๕.๙๐	๙๖.๖๗	
๔๒.	๗๙.๖๐	๙๖.๖๐	๙๙.๖๐	
๔๓.	๙๙.๖๐	๙๖.๖๐	๙๗.๗๗	
รวม	๒๐๕๖.๖๐	๒๕๕.๙๐	๒๙๕.๙๕	
เฉลี่ย	๔๙.๓๖	๙๖.๒๕	๙๔.๔๔	

ลักษณะของเนื้อไม้ทั้งเมื่อถูกหรือเดือยใหม่ ๆ จะเป็นสีขาวทึบไว้นานจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน เนื้อดำเรียบคุณภาพดี ไม่สักแต่เส้นวงรอบคืบไม่เคยขัดมากันนัก พอจะมองเห็นไม่นำหนักเบา เหมาะที่ทำเครื่องเรือน ฝาฟาน ตู้เรือ