

ความหลากหลายของเพรียงทำลายไม้ในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
ไทย

**Biodiversity of Marine Borers on the coast of Eastern and Southern of
Thailand.**

มยุรี จิตต์แก้ว¹ (Mayuree Jitkaew)

ไพวรรณ เล็กอุทัย¹ (Paiwan Lekuthai)

บทคัดย่อ

จากการสำรวจเพรียงทำลายไม้ในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย พบเพรียงทำลายไม้ทั้งหมด 19 ชนิด ในวงศ์ Teredinidae Pholadidae และ Sphaeromatidae และได้ทำการศึกษาการเพาะเลี้ยงเพรียงในสภาพธรรมชาติได้ผลดี

คำหลัก: //เพรียงทำลายไม้

Abstract

The study of biodiversity of marine borers on the coast of Eastern and Southern of Thailand, 19 species of marine borers was found. They are in the family Teredinidae , Pholadidae and Sphaeromatidae. The pallets of each species of Teredinidae are illustrated. Preliminary study of Teredinidae rearing in natural resource gives the good result.

Keywords : // Marine borers Teredinidae Pholadidae Sphaeromatidae

¹ นักวิทยาศาสตร์ 8ว. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ e-mail : rfd@forest.go.th