



กระพี้จั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Millettia brandisiana* Kurz

วงศ์ : LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น : กระพี้จั่น (กลาง พืชผุโลก) จั่น (กลาง สุโขทัย) ปี้จั่น (เหนือ) พี้จั่น (กลาง จันทบุรี)

พรรณไม้ประจำจังหวัด : แม่ฮ่องสอน

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 8 - 20 เมตร เปลือกสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเวียนสลับ มีใบย่อย แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบหู่ โคนใบมนหรือสอบเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจางกว่า ใบแก่เกลี้ยง มีขนประปรายตามเส้นกลางใบด้านล่าง ดอกรูปดอกถั่ว สีขาวปนม่วง ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ผลเป็นฝักแบน โคนแคบกว่าปลาย เปลือกเกลี้ยงหนา คล้ายแผ่นหนัง ขอบเป็นสัน เมล็ดสีน้ำตาลดำ

การกระจายพันธุ์ : เอเชียเขตร้อน ประเทศไทยพบทาง ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต้

ออกดอก : มีนาคม - พฤษภาคม

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด ปักชำราก

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ทำเชือกกระดาษ ค้ำเครื่องมือ ของเล่นเด็ก ทำดอกไม้ประดิษฐ์ ลำต้น เป็นยาพื้นบ้านอีสานใช้ลำต้นต้มดื่มบำรุงเลือด

