



หวายข้อดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Calamus manan* Miq.

วงศ์ : PALMAE

ชื่ออื่น : รอดแตมานา (มลายู นราธิวาส) หวายข้อดำ (กลาง)

ลักษณะทั่วไป : เป็นหวายขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นลำเดี่ยวๆ ไม่แตกกอ กาบหุ้มลำมีสีเขียวออกขาว มีหนามรูปสามเหลี่ยมแบนเรียงเป็นแถบเฉียงหรือขวางลำ หรือกระจายเดี่ยวๆ มีหนามขนาดเล็ก แทรกปนอยู่ไม่หนาแน่น ขอบหนามมีขุยสีดำ ปากกาบหุ้มลำมีหนาม knee เห็นชัด มีหนามรูปสามเหลี่ยมแบน และมีหนามขนาดเล็กกว่ากระจายอยู่ห่างๆ ก้านใบด้านล่างมีหนามรูปเล็บบนหีวยสีดำเรียงเดี่ยวๆ เป็นแถวห่างกันเป็นระยะๆ ก้านใบด้านบนบนเกลี้ยงไม่มีหนาม ทางใบค่อนข้างกลมด้านล่างและ ขอบมีหนามรูปเล็บบนหีวยสีดำขึ้นอยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ cirrus มีหนามรูปเล็บบนหีวยสีดำเรียงเป็นกลุ่มทางด้านล่าง ปลายหนามสีดำโคนสีเขียวออกเหลือง ใบย่อยรูปยาวรี สีเขียวออกเหลืองเมื่อสด และมีสีเขียวซีดเมื่อแห้ง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายใบมีหนามรูปขนสีดำ ใบย่อยแต่ละข้างของทางใบใบเรียง ตัวแบบสลับอย่างสม่ำเสมอ ผลรูปรี มีสีเหลืองเมื่อแห้ง สันเกล็ดหุ้มผลเป็นร่อง ขอบเกล็ดสีดำ

การกระจายพันธุ์ : กระจายทั่วไปบริเวณป่าเขตร้อน ในประเทศไทยพบบริเวณจังหวัดยะลาและนราธิวาส ภาคเหนือพบในจังหวัดน่าน แพร่ พะเยาและสุโขทัย

ออกดอก :-

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์

